

# Häufigkeitsverteilung von Höchstertragsjahren im Zeitraum 1950 bis 1998

Klassen Nr.	Komplexe Witterungs-werte (WWK) Grenzen	Ertrags-bildung	Insgesamt	Häufigkeitsverteilung der WWK										
				BKR										
				IIa/3	IIb/1	IIb/2	IIa/5	IIb/3	IIb/4	IIb/5	IIb/6	IIb/7	IIc/6	
1	950 - 1150	schlecht	4,7%	0,0%	5,9%	7,5%	0,0%	0,0%	13,8%	4,3%	5,9%	0,0%	5,4%	
2	1150 - 1350		15,7%	0,0%	41,2%	15,0%	0,0%	0,0%	13,8%	8,5%	5,9%	0,0%	18,9%	
3	1350 - 1550	normal	23,7%	20,0%	17,6%	12,5%	33,3%	25,0%	20,7%	21,3%	17,6%	0,0%	40,5%	
4	1550 - 1750		23,7%	20,0%	11,8%	17,5%	22,2%	25,0%	13,8%	23,4%	35,3%	22,2%	24,3%	
5	1750 - 1950		22,3%	40,0%	11,8%	27,5%	22,2%	0,0%	20,7%	31,9%	29,4%	44,4%	10,8%	
6	1950 - 2150	sehr gut	7,0%	20,0%	0,0%	15,0%	11,1%	25,0%	13,8%	8,5%	5,9%	22,2%	0,0%	
7	2150 - 2350		3,0%	0,0%	11,8%	5,0%	11,1%	25,0%	3,4%	2,1%	0,0%	11,1%	0,0%	
Summe			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Summe Klassen 3-5			69,7%	80,0%	41,2%	57,5%	77,8%	50,0%	55,2%	76,6%	82,4%	66,7%	75,7%	